

お勧めする酸素補給水の使用方法（対新型コロナウイルス）

今後毎日、体温（体温計）と可能であれば血液中酸素濃度（*パルスオキシメーター）を測定ください。特に、息苦しい、怠い、熱っぽい、味覚臭覚異常を感じた際は新型コロナ感染が疑われます。測定回数を増やし、必ずデータに残してください。

*政府は、新型コロナウイルス感染症の軽症者や無症状患者が療養する専用施設で、重症化の兆しを早期に発見するため血中酸素飽和濃度を測る「パルスオキシメーター」を活用する方針を固めた。
産経新聞 4月10日

1) 体温チェック

体温上昇は感染の可能性があります。平熱と比較し、37.5℃以上は要注意です。

2) 血液中酸素濃度（SpO2）チェック

感染し肺に炎症が発生すると血液中内の酸素濃度が低下します。

この炎症が拡大すると酸素を肺から取り入れにくくなり、息苦しくなります。

3) WOXの飲み方（WOXを飲むと体の酸素量が上昇します。）

息苦しい、怠い、熱っぽい、味覚異常を感じた等、感染が疑われた際や感染確認後

1日に500ml 1~2本を2~3週間（15日~20日）使用ください。

1回100~200mlを5回にわけ補給ください。

基本、食前と食間です。

注) 酸素を継続して飲むことで免疫力が増強します。

以上